

dell'ASP competente per territorio, per effettuare una vaccinazione con vaccino anti-pneumococcico coniugato 13 valente, anche i soggetti già vaccinati con una o due dosi di PPV 23) e successivamente, dopo otto settimane, con invito annotato sul tesserino delle vaccinazioni, a completamento della stessa, la somministrazione di una dose di vaccino anti-pneumococcico polisaccaridico 23 valente, solo se mai vaccinati con PPV 23.

TAB. 1

SOGGETTI DA SOTTOPORRE A VACCINAZIONI ANTI-PNEUMOCOCCICA

PATOLOGIA CHE PUO' DETERMINARE UNA CONDIZIONE DI RISCHIO	PCV 13	PPV 23
ASPLENIA ANATOMICA E FUNZIONALE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
IMMUNODEFICIENZE CONGENITE ED ACQUISITE (COMPRESO HIV)	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
DEFICIT FATTORI DEL COMPLEMENTO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
EMOGLOBINOPATIE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
TRAPIANTO DI MIDOLLO OSSEO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
TRAPIANTO DI ORGANI SOLIDI	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
PERDITA DI LIQUOR DA CAUSE CONGENITE ED ACQUISITE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
PORTATORI DI IMPIANTO COCLEARE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA E SINDROME NEFROSICA	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
LEUCEMIE, LINFOMI E MIELOMA MULTIPLO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
NEOPLASIE METASTATICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
MALATTIE POLMONARI CRONICHE CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
ALTRE MALATTIE POLMONARI CRONICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
DIABETE MELLITO CON SCARSO CONTROLLO METABOLICO	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
CIRROSI EPATICA, EPATOPATIE CRONICHE EVOLUTIVE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI
CARDIOPATIE CRONICHE	UNA DOSE	UNA DOSE DOPO TRE MESI

Il Dirigente del Servizio I
(Dott. Mario Palermo)

Il Dirigente Generale DASOE ad Interim
(Dott. Salvatore Sammartano)

Visto si Concorda
L'ASSESSORE
Dott.ssa Lucia Borsellino

